

## Hypoglycémie

Pas assez de sucre dans le sang <4mmol/l

Symptômes



Que faire ?

Prendre rapidement 4 morceaux de sucre ou de sucre de Raisin ou 1,5 dl de boisson sucrée (jus de fruit, coca...) puis :

Si l'hypoglycémie a lieu juste avant le repas, débiter celui-ci par les glucides (céréales, pain, pâtes, riz), si elle a lieu à distance du repas, prendre une collation (pain, fruit, yoghourt...)

Glycémie	Interprétation	Que faire ?
24	Glycémies beaucoup trop élevée= Hyperglycémie sévère	Contacter votre médecin
20		
16		
14	Glycémies trop élevées	Si les glycémies restent élevées, prenez rendez-vous chez votre médecin
12		
10	Glycémies bonne à acceptable	Demandez à votre médecin de vous donner vos objectifs
8		
7	Excellentes glycémies	Bon équilibre de vos glycémie
6		
5	Glycémies trop basses <b>Hypoglycémie</b>	Prendre 4 morceaux de sucre suivis du repas ou d'une collation
4		
2		

Le **Plan de traitement** s'utilise comme suit : **1° Le pharmacien** complète le document avec le patient **2°**Le document est faxé au médecin traitant et le plan de traitement remis au patient **3° Le médecin** contrôle, valide les informations et faxe le document en retour au pharmacien.

En cas de doute lors **de la délivrance du traitement**, le pharmacien prend directement contact avec le médecin pour valider les informations.

En cas **d'erreur lors du contrôle du document**, le médecin contacte son patient, effectue une correction sur le plan de traitement et le faxe au pharmacien.

Médicament	Matin	Midi	Soir	Au coucher	Repas			Indication
					Avant	Pendant	Après	

Médecin : \_\_\_\_\_ Tél: \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_  
 Pharmacie : \_\_\_\_\_ Tél: \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_

### Fax de validation

Remarques / questions :

Faxé le : \_\_\_\_\_

Pharmacie : (Tampon et signature)

Validé le : \_\_\_\_\_  
 Médecin : (Tampon et signature)

- Erreur de gestion du traitement  
 Signalée au patient le :

Le **Plan de traitement** s'utilise comme suit : **1° Le pharmacien** complète le document avec le patient **2°**Le document est faxé au médecin traitant et le plan de traitement remis au patient **3° Le médecin** contrôle, valide les informations et faxe le document en retour au pharmacien.  
 En cas de doute lors **de la délivrance du traitement**, le pharmacien prend directement contact avec le médecin pour valider les informations.  
 En cas **d'erreur lors du contrôle du document**, le médecin contacte son patient, effectue une correction sur le plan de traitement et le faxe au pharmacien.