Schéma thérapeutique

Diabète de type 2 : glycémie à jeun > 7,0 mmol/l

Régime + activité physique

HbA1c > 8% → **Monothérapie orale**

HbA1c entre 6,6 et 8,0% → Evaluer avantages/désavantages → **Monothérapie orale** / Continuer

HbA1c ≤ 6,5% → Continuer

Monothérapie orale

BMI > 25
- Biguanides / Glitazones
- Inhibiteurs de l'α-glucosidase
- Sulfonylurées / Glinides

BMI < 25
- Sulfonylurées / Glinides
- Inhibiteurs de l' α-glucosidase
- Biguanides / Glitazones

HbA1c > 8% → **Bithérapie orale**

HbA1c entre 6,6 et 8,0% → Evaluer avantages/désavantages → **Bithérapie orale** / Continuer

HbA1c ≤ 6,5% → Continuer

Bithérapie orale

Sulfonylurées / Glinides/glitazones +biguanides

Sulfonylurées / Glinides + α-glucosidases

Biguanides / Glitazones + α-glucosidases

HbA1c > 8% → **Insulinothérapie**

HbA1c entre 6,6 et 8,0% → Evaluer avantages/désavantages → **Insulinothérapie** / Continuer

HbA1c ≤ 6,5% → Continuer

Insulinothérapie

NPH ou Levemir au coucher
± biguanides
± sulfonylurées le jour

Echec → 2 injections → Echec → Insulinothérapie intensifiée

ou

Lantus matin ou soir
± biguanides

Echec → Insulinothérapie intensifiée